

Jakie skutki uboczne pociąga za sobą leczenie?

Leczeniu mogą towarzyszyć znaczne skutki uboczne, jak objawy grypopodobne, a także przejściowa niedokrwistość. Oprócz tego nierzadkie są psychiatryczne działania uboczne takie jak depresja i rozdrażnienie.

Czy są pacjenci, u których leczenie jest nieskuteczne?

Niestety u niektórych pacjentów, u których początkowo wystąpiła odpowiedź na leczenie jeszcze podczas leczenia lub po odstawieniu leków dochodzi do ponownego namnażania się wirusa (reaktywacja). Możliwe jest również „niezadziałanie” leczenia (brak odpowiedzi). W takich wypadkach zalecamy konsultację w ośrodku specjalizującym się w chorobach wątroby. Istnieją coraz to nowsze sposoby leczenia, w szczególności w ramach protokołów badań klinicznych.

Naszym partnerem w samopomocy pacjentów

jest „Deutsche Leberhilfe e. V.”. Informacje dla pacjentów i wiele adresów znajdują Państwo pod: Deutsche Leberhilfe e. V., Luxemburger Straße 150, 50937 Köln, telefon: 0221 - 28 29 980, e-mail: info@leberhilfe.org, strona internetowa: www.leberhilfe.org.

Niemiecka fundacja wątrobowa

ma za cel poprawę opieki na pacjentami przez wspieranie sieci badawczej i zmianę publicznego traktowania chorób wątroby. Dodatkowe informacje znajdują Państwo pod adresem www.deutsche-leberstiftung.de w Internecie.

Wydawca:

Deutsche Leberstiftung
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover

Telefon: 0511 - 532 6819
Telefax: 0511 - 532 6820

info@deutsche-leberstiftung.de

Stan: kwiecień 2008

Partner der
Deutschen
Leberstiftung



Deutsche
_Leberstiftung

Zapytaj eksperta

Pod numerem 01805 - 45 00 60 (€ 0,14/min. z niemieckiej sieci telefonicznej, inne ceny telefonii komórkowej). Konsultacja telefoniczna (w języku niemieckim) czynna jest od poniedziałku do piątku i godzinach od 14:00 do 16:00.

Wpłaty na badania

Pod numerem 09001 - 38 53 278 istnieje możliwość szybkiego łatwego przekazania darowizny poprzez naszą gorącą linię telefoniczną.

Aby wesprzeć Niemiecką Fundację Wątrobową możliwa jest także wpłata lub dofinansowanie przelewem.

Nasze konto bankowe:

Deutsche Leberstiftung, Konto: 10 55 600, BLZ: 370 205 00 (Bank für Sozialwirtschaft)

Jeśli potrzebne jest Państwu pokwitowanie darowizny, prosimy o podanie obok nazwiska również swojego pełnego adresu.

Będziemy wdzięczni za każde wsparcie!

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Informacje dla chorych i ich bliskich

polnisch

W Europie wiele milionów ludzi cierpi na przewlekłe choroby wątroby. U dorosłych pomiędzy 30 i 50 rokiem życia marskość wątroby (bliznowata przebudowa wątroby) zalicza się do czterech najczęstszych przyczyn śmierci spowodowanych chorobą. Często marskość wątroby poprzedzona jest zapaleniem wątroby.

Przyczynami zapalenia wątroby mogą być wszystkie typy wirusów zapalenia wątroby (A, B, C, D, E), przy czym infekcje spowodowane wirusami zapalenia wątroby typu B oraz C mogą przyjąć charakter przewlekły.

Ocenia się, iż w Europie występuje rocznie kilka tysięcy nowych zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Zakażenia wirusami typu A i E mają wyłącznie przebieg ostry. Również alkohol, stłuszczenie wątroby i choroby przemiany materii (na przykład cukrzyca) mogą prowadzić do zapalenia wątroby i w konsekwencji do przewlekłej choroby wątroby.

Jak często występuje zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C?

W Niemczech około 500.000 osób zainfekowanych jest wirusem zapalenia wątroby typu C.

Główne drogi zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)

- Wspólne korzystanie z igieł strzykawk
- Transfuzje krwi i preparatów krwiopochodnych
- Tatuaż/piercing
- U około 40% pacjentów dokładna droga i czas zakażenia pozostają niewyjaśnione

Czy można się zaszczepić przeciwko zapaleniu wątroby typu C?

Szczepienie możliwe jest tylko przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A i B, jednak nie przeciwko wirusowi typu C. Również w najbliższej przyszłości prawdopodobnie nie będzie żadnej szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C.

Objawy zakażenia HCV

- ok. 80% zakażonych w trakcie ostrej fazy zakażenia nie ma żadnych objawów
- w przypadku zakażenia przewlekłego mogą wystąpić objawy nietypowe jak zmęczenie i bóle w górnej części jamy brzusznej.
- nie ma typowego objawu, który mógłby wskazywać na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C.

Jak niebezpieczna jest infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C?

Ponad połowa zakażeń ma przebieg przewlekły. U części pacjentów może przekształcić się w marskość wątroby i raka wątroby (wątrobowokomórkowego)

Jak przebiega się diagnostyka?

Wykrycie przeciwciał (Anty-HCV) i bezpośrednie wykrycie wirusa (HCV-RNA) we krwi. Dla planowanego leczenia ważne może być oznaczenie genotypów HCV (1-6). W razie potrzeby diagnostykę uzupełnia biopsja wątroby.

Czy można leczyć wirusowe zapalenie wątroby typu C?

Tak! W przypadku ostrego zapalenia wątroby typu C przy wczesnym rozpoznaniu leczenie wstrzyknięciami interferonu-alfa może zapobiec przejściu w zapalenie przewlekłe.

W przypadku przewlekłego zapalenia wątroby typu C jako standardowe leczenie stosuje się skojarzenie pegylowanego interferonu i rybawiryny. Pegylowany interferon wstrzykiwany jest podskórnym raz w tygodniu. Tabletki rybawiryny podawane są codziennie.

Czas trwania terapii jest różnorodny i wynosi w zależności od typu wirusa i ilości wirusów 16 i 72 tygodni.